



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)

Tel. 06 16 66 66 54

[www.veterinaires-consultants.fr](http://www.veterinaires-consultants.fr)

# ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

**Dr Marie-Hélène LASSERON**

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 30/09/21  
Dr.Vétérinaire : LEFEVRE

**Propriétaire :** RABASSE  
**Animal :** "HAZELLE", CT 9A FS

## ANAMNESE

- ☐ **Chat d'intérieur**
- ☐ **Sous aliment paté CD Stress ND**
- ☐ **Consultation d'urgence il y a 1 semaine pour cystite. Traitée sous Meloxicam, scopalgine ® kesium ®**
- ☐ **Abattement anorexie vomissements, traitement possiblement non pris ces derniers jours en raison de la non coopération de HAZELLE.**
- ☐ **Bilan sanguin RAS, bandelette prot + GR + microscopique, DU**

## EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Liseré médullaire échogène bilatérale. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.  
RG 3,8 cm, RD 3,98 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales.  
SG : 3,9, SD : 3,4 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène. Choledoque normal 2 mm
- **Estomac :** Absence d'aliments. Vide. Paroi normale <2,5 mm avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée (2,4mm). Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Gastrique 3,8 mm

- **Mésentère/** Surcharge abdominale grasseuse diffuse.
- Cavité abdominale :**
- **Appareil** stérilisée
- reproducteur :**
- **Autre**
- **Cytoponctions/** Non réalisées.
- biopsies :**

## **CONCLUSION**

---


- ❖ **Absence d'anomalie abdominale décelable ce jour expliquant la clinique.**

### **Envisager**

- **Un traitement anxiolytique**
- **Des aliment hyperdigestibles/ hypoallergéniques HUMIDES pour limiter la cystite de stress et dans l'éventualité d'une allergie alimentaire**
- **Un orexigène (MIRATAZ ®)**
- **Un antimétiéique**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



**Marie-Hélène LASSERON**  
11 rue de Verdun  
14780 LION-SUR-MER  
N°18551