

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Blandine LEGAVRE

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Diplômée d'Oniris - Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes

Ancienne assistante de Médecine Interne à Oniris

blandine.legavre@gmail.com

N°Ordinal: 29593

Date : 27/10/2021

Propriétaire : Mme BLANQUER Sabine
sabine.blanquer@yahoo.com

Dr.Vétérinaire : Dr. CHATEILLER

Animal : MOKA, boxer FS,
20/08/2016

ANAMNESE

- ❑ **Pertes vulvaires cycliques rapportés depuis 2018 répondant aux antibiotiques.**
- ❑ **Exploration peu en faveur d'une rémanence ovarienne (dosage progestérone < 0.3 ng/L et frottis vaginal montrant une majorité de cellules parabasales, compatibles avec un anoestrus physiologique ou de stérilisation).**
- ❑ **Vulve encapuchonnée à l'examen clinique**

EXAMEN

- **Vessie :** En semi réplétion. Paroi fine et régulière (1.9 mm,, Cn ; <4 mm). Contenu anéchogène. Absence de sédiment et de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales (cortex 1/3, médulla 2/3). Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG : 6.6 cm, RD : 6 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 4.5 mm, SD : 5.9 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Taille, forme, échogénicité normale. Vascularisation sans anomalie.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Présence d'aliments. Estomac modérément distendu. Paroi normale avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée.

- Epaisseur normale (5.2 mm).
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée.
Epaisseur normale (3 mm).
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en faible quantité.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** Absence d'anomalie échographique. Absence d'épanchement.
- **Appareil reproducteur :** Utérus atrophié (7 mm de diamètre), homogène, sans dilation liquidienne. Absence d'ovaire ou de signe échographique compatible avec une rémanence ovarienne.
- **Autre** Absence d'anomalie.
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

Absence d'anomalie échographique ce jour.

Une rémanence ovarienne est exclue sur la base de l'examen échographique et des résultats des analyses hormonales et cytologiques. L'origine des vaginites à répétition semble d'avantage liée à une mauvaise conformation de la vulve (vulve encapuchonnée), favorisant les infections à répétitions.

❖ Prise en charge conseillée :

- ECBU en cas de nouvel épisode inflammatoire pour exclure une origine urinaire
- Correction chirurgicale de la vulve.

Confraternellement,

Dr Blandine LEGAVRE

Images disponibles sur demande à blandine.legavre@gmail.com