



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 08/10/21
Dr.Vétérinaire : LEFEVRE

Propriétaire : DENAJAR
Animal : "GRISSETTE", européenne FS née en 2010

ANAMNESE

- Cystite récidivante.**
- Sous clomipramine**

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. 1,3 mm
Contenu anéchogène avec assez importante quantité de particules échogènes en suspension. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 3,81 cm, RD 4,22 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales.
SG : 3,6 mm , SD : 3,1 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Aliments en quantité importante. Modérément distendu. Paroi normale 2,3 mm avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille normale 6-7 mm d'épaisseur. Hyperéchogénicité diffuse généralisée nette. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux. 7,6 mm NL mésentérique limite supérieur.
- **Mésentère/**
- Cavité abdominale :** Surcharge abdominale grasseuse diffuse.
- **Appareil reproducteur :** Stérilisé.

- **Autre**
- **Cytosonctions/ biopsies :** Cystocentèse échoguidée : urines du 1055

CONCLUSION

- ❖ **Surcharge graisseuse diffuse du pancréas liée au surpoids de Grisette.**
- ❖ **Absence d'autre anomalie abdominale décelable, notamment urinaire.**


L'hypothèse d'une cystite interstitielle chronique est très probable en relation avec l'anamnèse et la densité urinaire élevée.

Un aliment hypocalorique humide au long cours est fortement conseillé.

L'utilisation de AINS et antispasmodiques lors des crises est

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551