



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 27/09/21
Dr.Vétérinaire : COUQUE

Propriétaire : HERVE
Animal : "BANDIT", Berger Allemand M
né en juin 2011

ANAMNESE

- **Episodes récurrents d'hématurie pollakiurie fièvre malgré le traitement antibiotiques mis en place (Sultrian ND en cours).**

EXAMEN

- **Vessie :** En semi-réplétion. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène avec dépôt échogène mobile, et dépôt hyperéchogène avec cône d'ombre en zone déclive en quantité assez importante. Paroi épaissie 7,9 mm
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 17,4 cm, RD 9,4 cm. Présence d'un kyste rénal gauche anéchogène de paroi fine dans le cortex estimé à 4,8 mm.
- **Uretères :** Epaissi 14,6 mm, régulier, lumière virtuelle.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille augmenté au pôle caudal de la surrénale droite. Echostructure et échogénicité normales.
SG : 7,3, SD : 9,3 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Modérément distendu. Paroi normale avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** Hyperéchogénicité modérée à discrète autour de la prostate. Très discret épanchement abdominal non ponctionnable.

- **Appareil reproducteur :** Testicule droit avec nodule périphérique tissulaire hypoéchogène de 7,6 mm. Prostate basculée dans l'abdomen et de taille augmentée. Nombreuses cavités anéchogènes de 5-9 mm de diamètre ; graisse périphérique hyperéchogène modérément. Taille 5,7 cm de diamètre. Forme modifiée avec perte du sillon médian. Absence de minéralisations. Parenchyme tissulaire par endroit légèrement hétérogène.
- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION


- ❖ **Cystite et sablose vésicale, avec prostatite sur hyperplasie glandulokystique de la prostate importante d'origine infectieuse bactérienne très probable.**
- ❖ **Nodule testiculaire tumoral droite de 7,6 mm.**
- ❖ **Discret épanchement abdominal associée.**

Ypozane tous les 5 mois. Ou castration chirurgicale présentant l'avantage du retrait du nodule testiculaire. Cystocentèse conseillée pour mise en culture et ECBU. A faire également 5 jours après la fin du traitement antibiotiques (AB conseillé pdt 3-5 semaines). Passage aux quinolones si antibiogramme urinaire préalable permissif.

Des cytoponctions prostatiques pour exclure un processus tumoral sous-jacent sont également réalisables pour compléter l'exploration ou si l'évolution clinique l'indique (non souhaitées ce jour par la propriétaire).

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551