



camilleodin@gmail.com

# ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

**Dr Camille ODIN**

Vétérinaire Consultant, Itinérant en Normandie  
Diplômée du CEAV de Médecine Interne  
Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date : 11/10/2021  
Vétérinaire traitant: Dr. Letisse

Propriétaire : Mme Bouche  
Animal : Réglisse, européen, MC, 18 ans, 3,5 kg

## **ANAMNESE**

---

- Bilan senior avec cPL augmentées

## **EXAMEN**

---

- **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Echostructure modifiée, échogénicité et taille normales. Cortex épaissi, atténuation de la différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG : 3,6 cm RD : 3,8cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales.
- **Rate :** Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.
- **Foie :** Zone polykystique localisée au lobe médial gauche avec multiples kystes de quelques mm formant un effet de masse 1,98x1,53 cm. Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Discrètement hyperéchogène de façon diffuse et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale environnante.
- **Duodénum :** Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.
- **Jéjunum/iléon :** Absence d'anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou d'occlusion.
- **Colon :** Paroi fine. Air et selles en quantité normale.
- **Nœuds lymphatiques :** NI iléo-colique : discrètement hypoéchogènes, stéatite, ep. 3,7 et 3,8 mm
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** Absence d'anomalie échographiquement visible ce jour.

- **Appareil reproducteur :** Stérilisé.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

## **CONCLUSION**

---

- ❖ **Lésion multi-kystique localisée sur le lobe hépatique médial gauche formant un effet de masse de 1,98x1,53 cm, bénin en 1<sup>ère</sup> intention, en relation avec le contexte clinique.**
- ❖ **Lésions rénales en faveur d'une Néphropathie bilatérale chronique.**
- ❖ **Signes discrets de pancréatite chronique.**

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille  
Vétérinaire (n° 24738)  
camilleodin@gmail.com



Images disponibles sur demande e-mail adressée à [camilleodin@gmail.com](mailto:camilleodin@gmail.com)

---

[www.veterinaires-consultants.fr](http://www.veterinaires-consultants.fr)

**Dr M.Hélène LASSERON**  
Echographie abdominale  
Echographie cardiaque  
Médecine interne et cardiologie  
[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)

**Dr Camille ODIN**  
Echographie abdominale  
Echographie cardiaque  
Médecine interne et cardiologie  
[camilleodin@gmail.com](mailto:camilleodin@gmail.com)