



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 15/10/21
Dr.Vétérinaire : DELNOOZ

Propriétaire : MOURIER
Animal : "SCOTT", westie M né le
12/02/21

ANAMNESE

- Dysorexie, abattement important**
- Quelques épisodes de vomissements diarrhéés.**
- amaigrissement**

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 4,18 cm, RD 5,08 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales.
- **Rate :** Déformée par une volumineuse masse hétérogène tissulaire (4-5 cm) au pôle caudal et par de multiples nodules hypoéchogènes (6-12 mm) répartis dans le reste du parenchyme.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille nettement augmentée. Hyperéchogénicité diffuse. et contours bombés. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec dépôt échogène mobile.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi normale avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi épaissie de façon régulière 3-4 mm en zone ascendante et transverse. Vide de selles. Couches conservées.
- **Nœuds lymphatiques :** Hypertrophie hypoéchogène multiple, par endroits légèrement hétérogène, avec certains arrondis (hépatique par exemple)
NL hépatique : 148 X 2,5 cm
Mésentériques : 7 mm.
Iléocoecaux : 7,1 mm
- **Mésentère/** Epanchement anéchogène en petite quantité. Graisse abdominale légèrement


- Cavité abdominale :** hyperéchogène de façon diffuse , et plus marquée en périphérie de la masse splénique.
- **Appareil reproducteur :** Testicules normaux. Prostate petite.
- **Autre** Images tissulaires sous diaphragmatiques de 4-5 mm en faible nombre à la surface des poumons.
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non souhaitées.

CONCLUSION

- ❖ **Processus cancéreux agressif de point de départ possiblement splénique ou sanguin (hémopathie maligne), avec extension aux nœuds lymphatiques hépatiques et iléococecaux. Extension suspecté aux poumons, au colon, et très probable au niveau hépatique.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551