



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 27/10/21
Dr.Vétérinaire : LANDE

Propriétaire : PEZARD
Animal : "SALLY", Bulldog anglaise F née le 04/08/21.

ANAMNESE

- ☐ **Episode récent de cystite.**
- ☐ **Vérification d'absence d'anomalie congénitale de conformation de l'appareil génito urinaire.**
- ☐ **Absence d'incontinence urinaire actuellement**
- ☐ **PUPD**

EXAMEN Réalisé après injection furosémide 1 mg/kg SC. Réalisation des images limitées par la présence d'un bol alimentaire en transit ce jour.

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale. Jet urétéraux bilatéraux bien discernables en provenance des 2 papilles urétérales, en position physiologique.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 5,9 cm, RD 6,5 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 3,7, SD : 3,9 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Présence d'aliments et de gaz limitant les images. Modérément distendu. Paroi normale avec architecture en couches conservée 2,5 mm. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds** Normaux.

- lymphatiques :**
- **Mésentère/** Epanchement abdominal en quantité faible, anéchogène.
- Cavité abdominale :**
- **Appareil reproducteur :** Cornes utérines, ovaires, col utérin petits, sans contenu suspect.
- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Abouchements urétéraux normaux en position physiologique.**
- ❖ **Absence d'anomalie uro-génitale décelable ce jour.**
- ❖ **Epanchement abdominal en faible quantité d'origine physiologique probable.**

Certains jeunes animaux sont en PUPD les premiers mois, en raison d'une immaturité rénale qui rétrocède naturellement avec la croissance. Dans ce cas la PUPD disparaît au cours de la croissance. Si la PUPD persiste, envisager une analyse d'urine (densité, protéinurie, culot), un dosage d'albuminémie, un test de restriction hydrique.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551