



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 29/10/21
Dr.Vétérinaire : JAMROT

Propriétaire : POULAIN
Animal : "

ANAMNESE

- ☐ **Abattement**
- ☐ **Vomissement**
- ☐ **Anémie**

EXAMEN

- **Vessie :** Vide. Paroi fine et régulière.
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. Plusieurs nodules hyperéchogène 5 mm à la jonction CM de façon bilatérale.
RG 7,2 cm, RD 7,5 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales.
SG : 7,6, SD : NO d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Déformée par une volumineuse masse tissulaire hétérogène de 8 cm de diamètre environ. Présence an périphérie de la masse d'un nodule de 14 mm hyperéchogène avec ombre postérieure. Effraction capsulaire.
- **Foie :** Masse hépatique gauche hétérogène hyperéchogène de 7-8 cm dans le lobe médial, avec multiples autres nodules parenchymateux hypoéchogènes hétérogène dans les autres lobes. Effraction vasculaire fortement suspectée. Stase veineuse secondaire à l'infiltration (veines sus-hépatiques)
- **Vésicule biliaire :** Vide, paroi très épaissie 3,5 mm.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Modérément distendu par des gaz. Paroi épaissie de façon régulière (5 mm) avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi très épaissie en zone ascendante et transverse (3,3 mm). Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/** Important épanchement hypoéchogène.

Cavité abdominale :


- **Appareil reproducteur :** Prostate 3,67 cm largeur, hétérogène avec multiples petites acvités liquidiennes anéchogènes de 2 -3 mm. Testicules NO.
- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Processus tumoral agressif, envahissant la rate (masse de 7-9 cm) et le foie (multiples nodules et masse de 7-8 cm), avec épanchement abdominal important (hémoabdomen très probable). Compression et infiltration de la vascularisation veineuse sus-hépatique par la tumeur.**
- ❖ **Cholécystite et colite associées.**
- ❖ **Nodules rénaux suspect d'origine métastatique.**
- ❖ **Gastrite chronique.**
- ❖ **Hyperplasie glandulokystique bénigne de la prostate.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551