



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 29/11/21
Dr.Vétérinaire : JAMROT

Propriétaire : CARDONA
Animal : "MAYA", cocker anglaise FS née
le 21/08/2016

ANAMNESE

- ☐ **Perte de pus à la vulve depuis 2 cm**
- ☐ **Antécédents de cystite**
- ☐ **BEG sinon**

EXAMEN

- **Vessie :** Quasi vide. Paroi épaissie 8 mm
Présence d'une image arrondie hyperéchogène avec cône d'ombre franc de 3 X 2 cm de diamètre (interface lisse).
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Présence de fines images hyperéchogènes millimétriques avec fin cône d'ombre dans les récessus pyéliqués des deux reins. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.
RG 5 cm, RD 5,4 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales.
SG : 4,7 mm, SD : 4,7 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille diminuée. Echogénicité et contours normaux. Vascularisation portale intrahepatique peu développée. Absence d'anomalie des conduits biliaires.
ETUDE PORTALE EXTRA HEPATIQUE: diamètre de la veine porte diminuée (3,4 mm) en aval de l'abouchement de la veine splénique. Cette dernière apparaît dilatée, de flux anormal hépatofuge se dirigeant dorsalement vers la gauche, croisant la veine cave caudale sans s'y aboucher, pour rejoindre un vaisseau plus dorsal peu tortueux (Veine Azygos).
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Modérément distendu. Paroi normale avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.

- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles liquides.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** Discret  panchement abdominal.
- **Appareil reproducteur :** Castr 
- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non r alis es.

CONCLUSION

- ❖ **Anomalie cong nitale de type shunt extrahepatique Porto-Azygos**
- ❖ **Microh patie et petites lithiases r nales bilat rales secondaires.**
- ❖ **Volumineuse lithiases de 2 X 3 cm v sicale avec cystite associ e.**


Prise en charge propos e :

Soit m dicale du shunt (aliment h patique   vie + lavctulose A VIE + antibioth rapie occasionnelle + surveillance urinaire   vie) et cystotomie retrait du calcul,
Soit chirurgicale du shunt avec ligature pour viser une gu rison compl te, et une cystotomie retrait calcul   cette occasion. Risque op ratoires   discuter avec le chirurgien.

ECBU sur les urines   cette occasion conseill .

Confraternellement,

Dr Marie-H l ne LASSERON



Marie-H l ne LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N 18551