



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 22/11/21
Dr.Vétérinaire : CHATEILLER

Propriétaire : DARMON
Animal : "FENDI", Berger des Pyrenees
FS née le 01/07/10

ANAMNESE

- ☐ **Chirurgie il y a 2 mois : exérèse chaîne mammaire G (nodules bénin à l'histologie) et nodulectomie MSD (carcinome tubulo-papillaire sans embolies, malin).**
- ☐ **BEG**
- ☐ **Bilan d'extension ce jour**

EXAMEN

- **Vessie :** Peu remplie. Paroi discrètement irrégulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 4,8 cm, RD 4,39 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 6,7 mm, SD : 5 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation. Présence de quelques foyers de 3-6 mm périvasculaires hyperéchogènes hilaires certains avec ombre postérieure.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille augmentée. Présence de d'1 nodule hypoéchogène discret en zone médiane gauche (lobe latéral gauche). Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec dépôt échogène mobile en petite quantité.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Modérément distendu. Paroi normale avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2,5 mm.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Iliques médiaux 3 mm
Sacré gauche hypoéchogène ovalaire 3,4 mm.

- Pancréatico-duodénal 4,4 mm.
RAS
- **Mésentère/**
Cavité abdominale :
- **Appareil**
reproducteur : Castré
- **Autre**
- **Cytoponctions/**
biopsies : Non réalisées.


CONCLUSION

- ❖ **Nœuds lymphatiques iliaques médiaux normaux.**
- ❖ **Discrète lymphadénomégalie sacrée gauche (3,4 mm)**
- ❖ **Infiltrats graisseux spléniques bénins.**
- ❖ **Discrète lymphadénomégalie pancréatico-duodénale non spécifique de découverte fortuite possible.**
- ❖ **Hépatomégalie de surcharge glycogéno-lipidique bénigne : explorer une dysendocrinie (hypothyroïdie, hypercorticisme) si la clinique l'indique.**

Absence de signes d'extension tumorale abdominale ce jour.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551