mhlasseron@yahoo.fr
Tel. 06 16 66 66 54
www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON
Vétérinaire Consultante
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.
N°Ordinal: 18551

Date : 08/11/21
Dr.Vétérinaire : GARNIER

Propriétaire : RIOULT
Animal : "MILOU", CN M X 10A

ANAMNESE

- ***Lipasémie et cholesterol augmentés***
- ***PUPD***
- ***Diabète de découverte récente.***

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. Présence d'une image retractée corticale hyperéchogène au pôle caudal de chaque rein. RG 4,8 cm, RD 4,94 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 5,4, SD : 5,4 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Nodule plurilobulé hypoéchogène hétérogène vascularsiée modérément en Doppler couleur, évalué à 2,06 cm de diamètre, en zone du corps/ de la queue de la rate. Contours nets bien délimités. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille augmentée nettement. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Modérément distendu par des gaz (polypnée). Paroi normale 3 mm avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3 mm
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.

- **Mésentère/ Cavité abdominale :** RAS
- **Appareil reproducteur :** Testicules RAS. Prostate de taille modérément augmentée 3,5 cm largeur avec quelques cavités anéchogènes de 2-3 mm dans le parenchyme. Forme normale.

- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- **Nodule splénique de 2 cm, bénin ou malin. Une hyperplasie localisée, un foyer d'hématopoïèse extramédullaire bénins sont possible avec cet aspect.**
  Il est conseillé de recontrôler la lésion dans 1-1,5 mois, et si possible à cette occasion de réaliser des ponctions échoguidées pour en préciser la nature si une splénectomie est envisagée.
- **Infarctus rénaux bilatéraux bénins, de découverte fortuite.**
- **Hépatomégalie de surcharge liée au diabète.**
- **Absence d'autre anomalie abdominale décelable, notamment pancréatique.**

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON