



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 22/11/21
Dr.Vétérinaire : CHATEILLER

Propriétaire : ROBERTSON
Animal : "LILI", européenne FS née le
01/07/2016

ANAMNESE

- ❑ **IR évoluant depuis 1 mois (Urée 2,6 g/L creat 62,5 mg/L) avec amaigrissement, et phases d'abattement marqué anorexie hyperkaliémie hyperphosphorémie et hypercalcémie.**
- ❑ **NFS avec hémococoncentration sans autre anomalie.**

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille dans les limites inférieures de la normale. Contours légèrement bosselés en regard de triangles hyperéchogènes corticaux bilatéraux (5-7 par rein). Echogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique à droite. Dilatation pyélique discrète 2 mm avec image hyperéchogène et cône d'ombre franc en zone pyélique évaluée à 5,2 mm.
RG 3,41 cm, RD 3,46 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales.
SG : 2,2, SD : 3 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi régulièrement épaissie 1,3 mm. Contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi normale 1,9 mm avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds** Normaux.

- lymphatiques :**
- **Mésentère/** RAS
- Cavité abdominale :**
- **Appareil** Castré
- reproducteur :**
- **Autre**
- **Cytoponctions/** Cystocentèse échoguidée : 5 mL d'urines jaune clair. DU 1025, Prot 1+ (à peine).
- biopsies :**

CONCLUSION

- ❖ **Infarctus rénaux bilatéraux multiples, non spécifiques : rechercher une infection thrombogène, une cardiopathie si la clinique l'indique.**
- ❖ **Calcul rénal pyélique gauche de 5,2 mm, non compliqué, non obstructif.**
- ❖ **Reste de l'architecture rénale non modifiée.**

Envisager une IRA toxique (lys, antigène glycol), ou infectieuse (leptospirose).

Traitement : perfusion si nécessaire IV de réhydratation, aliment type rénal, chélateur de phosphore, mirtazapine, emeprid ou maropitant...


Antibiothérapie amoxicilline-acide clavulanique.

Sérologie leptospirose.

Envisager des biopsies rénales si l'évolution clinique l'indique.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551