mhlasseron@yahoo.fr
Tel. 06 16 66 66 54
www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON
Vétérinaire Consultante
Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.
N°Ordinal: 18551

Date : 24/11/21
Dr.Vétérinaire : LHOIR

Propriétaire : ROUSSELIN
Animal : "ROXY", européen MC né le 12/06/20

ANAMNESE

- ***Abattement vomissements***
- ***Bilan sanguin normal***
- ***Amélioration sous hospitalisation perfusion***

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Image hyperéchogène de 1 mm dans le bassinet droit le long de la crête rénale. Dilatation pyélique bilatérale assez nette : 2,3 mm. RG 4,23 cm, RD 4,14 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible, notamment de lithiase décelable.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille légèrement augmentée, forme normale. Piqueté hyperéchogène bilatéral. Echostructure et échogénicité normales. SG : 4,6, SD : 5 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille modérément augmentée. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec dépôt échogène mobile en quantité modérée.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Paroi épaissie de façon diffuse (2,7 mm) avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille normale. Hypoéchogénicité discrète. Discrète hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie du corps. CPP non dilaté.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale. Papille normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Vide. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles molles en petite quantité.
- **Nœuds lymphatiques :** Coliques moyens :5,7 mm hypoéchogènes
  Mésentériques 4,2-4,6 mm
  Iléocoecaux 4,6 hypoéchogènes

Pancréatico-duodénal 3,2 mm hile hyperéchogène.

- **Mésentère/ Cavité abdominale :** Hyperéchogéhicité discrète en zone craniale droite et péripylorique de la graisse.
- **Appareil reproducteur :** Castré
- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- **Gastrite non spécifique (origine parasitaire, toxique, infectieuse, dysimmunitaire possible).**
- **Pancréatite aigue modérée du corps du pancréas.**
- **Lymphadénomégalie digestive modérée généralisée.**

En complément du traitement symptomatiques, un traitement antiparasitaire est indiqué, ainsi que le passe à un aliment hyperdigestible ou hypoallergénique.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON