



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)  
Tel. 06 16 66 66 54

[www.veterinaires-consultants.fr](http://www.veterinaires-consultants.fr)

# ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

**Dr Marie-Hélène LASSERON**

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 29/11/21  
Dr.Vétérinaire : MENAGER

**Propriétaire :** SAINT AUBIN  
**Animal :** "RAMSES", européenne FS née le 27/07/20

## ANAMNESE

- Mordue par un chien il y a 3 jours. Arrivée très abattue avec muqueuses blanches.**
- Stable en hospitalisation sous perfusion hémoced ® dexaméthasone.**
- Bilan ce jour**

## EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille normale. Contours bosselés à droite avec graisse périphérique hyperéchogène en regard, et perte de continuité de la capsule sur une zone de 1 cm capsulaire caudale hilare à droite et lésion anéchogène en regard, de petite taille, liquidienne en partie dans le rétropéritoine. Bassinet hyperéchogène à droite.  
Rein gauche normal.  
Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.  
RG 3,54 cm, RD 3,98 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales.  
SG : 3,5, SD : 3,5 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Atrophiée 6 X 19 mm, légèrement hétérogène, sans réaction périphérique suspecte de rupture capsulaire.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires. Veine porte de petit diamètre.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Modérément distendu. Paroi normale avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds** Normaux.

- lymphatiques :**
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** Epanchement échogène cellulaire en quantité modérée. Graisse hyperéchogène de façon diffuse.
- **Appareil reproducteur :** Castré
- **Autre** Défaut de continuité de la paroi abdominale en zone paramédiane droite abdominale : au moins sur 2 zones de 5 et 14 mm de diamètre. Sur cette dernière, engagement de graisse abdominale en SC.  
En zone sous cutanée droite abdominale et flanc droit : graisse réactive, épanchement richement cellulaire.  
Reste de la graisse SC abdominale ventrale hyperéchogène et hypoéchogène réactionnelle.  
Veine cave de petit diamètre.
- **Cytponctions/ biopsies :** Non réalisées.

## **CONCLUSION**

---

- ❖ **Traumatismes rénaux à droite, avec pyélite et fracture/hématome rénal de petite taille au pôle caudal.**
- ❖ **Epanchement abdominal modéré (probable hemoabdomen).**
- ❖ **Epanchement sous cutané surtout latéral abdominal droit (probablement hémorragique CF hématome cutané important visible après tonte), avec 2 brèches musculaires de la paroi abdominale : 14 mm avec hernie graisseuse non étranglée de petite importance, et 5 mm sans hernie).**
- ❖ **Hypovolémie.**

Hospitalisation perfusion sous surveillance 24h, et suivis température et hématocrite si la clinique l'indique. Gavages.

Pansement compressif pour aider à la coagulation.

Hemoced ®, antalgiques. Couverture antibiotique.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



**Marie-Hélène LASSERON**  
11 rue de Verdun  
14780 LION-SUR-MER  
N°18551