



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 10/11/21
Dr.Vétérinaire : BARRE

Propriétaire : SOOFI
Animal : "FOUZOUL" croisé Norvégien M
né le 03/03/15

ANAMNESE

- Anémie dysorexie**
- Amélioration sous corticoïdes**

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 4,94 cm, RD5,06 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 5,5, SD : 5,6 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation. Nodule hyperéchogène face dorsale du corps 5,7 mm.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Hyperéchogénicité diffuse modérée. Contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Modérément distendu. Paroi normale avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille normale. Hyperéchogénicité diffuse. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux. PDD 3 mm, JJ 5,1 mm.
- **Mésentère/** RAS
- **Cavité abdominale :**
- **Appareil reproducteur :** Castré

- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Surcharge abdominale graisseuse diffuse.**
- ❖ **Surcharge graisseuse hépatique et pancréatique bénigne.**
- ❖ **Nodule splénique isolé de 5,7 mm, de découverte fortuite.**

Absence de signe de pancréatite.

Un régime alimentaire de restriction calorique est fortement conseillé pour limiter le risque de pancréatite, de diabète, surtout lors de la prise des corticoïdes.

Une anémie d'origine immunitaire est possible.

Un frottis sanguin complémentaire peut aider à identifier une cause éventuelle.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

