



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 17/11/21
Dr.Vétérinaire : LEFEVRE

Propriétaire : VERDIER
Animal : "LINA", européenne FS 2 ans.

ANAMNESE

- Anorexie persistante**
- Bilan sanguin RAS, sauf discrète hypoprotéinémie.**
- Episode de fièvre à 40°**

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 3,4 cm, RD cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 4, SD : 3,4 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Présence d'un contenu alimentaire très liquide en quantité importante, avec hypermotilité. Paroi normale 2 mm avec architecture en couches conservée. Pylore perméable distendu par du contenu alimentaire. Présence de 3 images libres dans le corps de l'estomac, crénelées, hyperéchogènes avec cône d'ombre franc : 2,12 cm, 3 cm, et 0,57 cm respectivement.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Sévèrement dilaté sur les 3-4 premiers cm, jusqu'à une image obstructive crénelée hyperéchogène, distendant l'anse, évaluée à 2,4 cm de longueur. Anse totalement vide en aval.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale. 1,8 mm. Vide de contenu.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de peu de selles.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/** RAS
- **Cavité abdominale :**

- **Appareil reproducteur :** Castré
- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Présence de 4 CE digestifs : 1 de 2,46 cm obstructif dans le duodénum descendant, et 3 libres non obstructifs dans l'estomac de 2,12, 3 cm et 0,57 cm de diamètre (noyaux ou morceaux de plastique ?)**
- ❖ **Reste de l'examen abdominal.**

Indication chirurgicale urgente : retrait des 4 CE.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

