



camilleodin@gmail.com

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Camille ODIN

Vétérinaire Consultant, Itinérant en Normandie
Diplômée du CEAV de Médecine Interne
Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler

N°Ordinal: 24738

Date : 3/12/2021
Vétérinaire traitant: Dr. Maenza

Propriétaire : Mme Desvaux
Animal : Mistigri, européen, MC, 12 ans, 3,9 kg

ANAMNESE

- ❑ Exploration d'épanchement abdominal d'apparition récente
- ❑ Fugue 3 jours, PUPD, déshydratation, ascite en quantité importante vidangé par furosémide
- ❑ Neutrophilie modérée
- ❑ Biochimie dans les VU (notamment Alb 27g/L) hormis PAL légèrement augmentées

EXAMEN

- **Vessie :** Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille augmentée. Cortex hyper échogène et épaissi. Echostructure conservée. Différenciation corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG : 4,3 cm RD : 4,7 cm
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme et échostructure normales. SG : 3,4 mm SD : 3,8 mm
- **Rate :** Parenchyme homogène d'échogénicité normale. Taille et contours normaux. Pédicule vasculaire visualisé d'aspect normal.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène.
- **Estomac :** Présence d'aliments. Paroi d'épaisseur normale. Absence de rétention gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d'anomalie pylorique.
- **Pancréas :** Echogénicité et taille normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale environnante.
- **Duodénum :** Paroi d'épaisseur normale. Architecture en couches conservée.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi épaissie de façon modérée et diffuse (3,4 mm). Architecture en couches conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d'obstruction ou d'occlusion.
- **Colon :** Paroi fine. Air et selles en quantité importante.
- **Nœuds lymphatiques :** Absence de lymphadénomégalie abdominale.
- **Mésentère/**

- Cavité abdominale :** Liquide en quantité très discrète. Hyperéchogénicité diffuse de la graisse abdominale.
- **Appareil reproducteur :** Stérilisé.
- **Autre** RAS
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Epaississement pariétal intestinal diffus en faveur d'une entéropathie chronique ou d'un processus néoplasique intestinal (type lymphome de bas grade).**
- ❖ **Néphromégalie bilatérale compatible dans ce contexte avec un processus tumoral (lymphome rénal notamment), une néphrite interstitielle ou une amyloïdose.**
- ❖ **Coprostase.**
- ❖ **Stéatite abdominale diffuse et modérée.**

Confraternellement,

Dr Camille Odin

Dr Odin Camille
Vétérinaire (n° 24738)
camilleodin@gmail.com



Images disponibles sur demande e-mail adressée à camilleodin@gmail.com

www.veterinaires-consultants.fr

Dr M.Hélène LASSERON
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
Médecine interne et cardiologie
mhlasseron@yahoo.fr

Dr Camille ODIN
Echographie abdominale
Echographie cardiaque
Médecine interne et cardiologie
camilleodin@gmail.com