



[mhlasseron@yahoo.fr](mailto:mhlasseron@yahoo.fr)  
Tel. 06 16 66 66 54

[www.veterinaires-consultants.fr](http://www.veterinaires-consultants.fr)

# ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

**Dr Marie-Hélène LASSERON**

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 13/12/21

Dr.Vétérinaire : LECLUZE ET BUREAU

Propriétaire : ELISABETH

Animal : "NERON", cane Corso M né le 18/04/17

## ANAMNESE

- Episode d'abattement vomissements aigus ile 01/09/21. Laparotomie exploratrice ayant montré une sévère pancréatite aigue nécrotico-hémorragique avec adhérences, d'origine possiblement traumatique (collision violente avec congénère à gauche)**
- Résolution progressive sous traitement.**
- Sous aliment gastro intestinal actuellement, poids stable, BEG.**
- Episodes de PICA / gêne gastrique suspectée.**
- Phases passagères d'essoufflement décrites, au repos.**

## EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 9,26 cm, RD 9,04 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 5,5, SD : 6,6 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Vide. Paroi légèrement épaissie notamment au niveau de la couche musculieuse, avec architecture en couches conservée (8 mm). Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale à droite. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie. A gauche : taille très légèrement augmentée à 16,1 mm d'épaisseur vs 11,2 pour le lobe droit, avec discrète hyperéchogénicité de la graisse adjacente. Contours bien délimités.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3,3 mm.

- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** Discrète hyperéchogénicité graisseuse abdominale à proximité du corps de l'estomac et du lobe gauche du pancréas.
- **Appareil reproducteur :** Testicules normaux. Prostate 4,7 cm de diamètre, homogène, bilobée.
- **Autre** Examen cardiaque simple : absence de dilatation cavitaire majeure décelable.
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

## **CONCLUSION**

---

- ❖ **Très discrets signes résiduels de pancréatite ancienne à gauche.**
- ❖ **Gastrite chronique.**

Examen très encourageant avec absence de lésion majeure décelable ce jour et excellente cicatrisation du pancréas.

Garder un aliment GI strict au long cours. Eviter dorénavant les écarts alimentaires gras.

Un traitement gastroprotecteur est conseillé au long cours et en fonction des épisodes de PICA/gêne digestive : Phosphaluvet ®, ou Ulcar ® par exemple.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

