

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Dr Blandine LEGAVRE

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Diplômée d'Oniris - Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes

Ancienne assistante de Médecine Interne à Oniris

blandine.legavre@gmail.com

N°Ordinal: 29593

Date : 28/12/2021
Dr.Vétérinaire : Dr. GRANDCOLLOT

Propriétaire : Mme BOULOT
Animal : VELVETINA, FS golden retriever, 25/05/2012

ANAMNESE

- ❑ **Chirurgie d'ovariohystérectomie sur pyomètre en septembre 2021, sans répercussion biochimique objectivée.**
- ❑ **Cystite bactérienne (*E. coli*) résistante aux β -lactamines, caractérisée par une malpropreté et des urines malodorantes (absence de polakyurie rapportée ou dysurie). Traitée par fosfomycine mais réponse clinique partielle (amélioration pendant 48 heures). Amélioration clinique sous amoxicilline/acide clavulanique, mis en place il y a 72 heures.**

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière (3 mm, $CN < 4mm$). Contenu anéchogène. Absence de sédiment et de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales (cortex 1/3, médulla 2/3). Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. Présence d'un anneau médullaire de 1.5 mm.
RG : 6.3 cm, RD : 6.2 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales.
SG : 6.9 mm, SD : 6.4 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Taille, forme, échogénicité normale. Vascularisation sans anomalie.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Présence d'aliments. Modérément distendu. Paroi normale avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse périphérique.

- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles en faible quantité.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/ Cavité abdominale :** Absence d'anomalie échographique. Absence d'épanchement.
- **Appareil reproducteur :** Absence d'anomalie échographique.
- **Autre** Absence d'anomalie.
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

Examen échographique sans anomalie ce jour.

❖ Prise en charge conseillée :

- Poursuite du traitement antibiotique (10 jours de traitement en tout) et ECBU de contrôle à la fin du traitement (prélèvement par cystocentèse et culture urinaire quantitativement positive si pousse > 1 000 UFC/mL)
- En cas de récurrence, recherche de facteurs favorisants (diabète sucré, hypercorticisme, maladie rénale chronique)

Confraternellement,

Dr Blandine LEGAVRE

Images disponibles sur demande à blandine.legavre@gmail.com