



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 08/12/21
Dr.Vétérinaire : CHARQUET

Propriétaire : GRIVEL
Animal : "IROISE", Boxer FS née le 01/09/13

ANAMNESE

- Episodes de nausées, ptyalisme, PICA d'herbe, vomissements depuis 1,5 mois.**
- Gingivectomie détartrage récemment. Ulcérations gingivales présentes.**
- Croquettes ORIJENE et haricots verts**
- Nodule d'1 cm SC mobilisable sous axillaire droit.**

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 6,45 cm, RD 6,43 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 5,9, SD : 6,5 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Présence de gaz limitant l'exploration du contenu et de la paroi dorsale. Paroi normale 2,8-3,6 mm, avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 4,1
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux. JJ 3,1 mm.
- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** RAS

- **Appareil reproducteur :** Stérilisée.
- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

❖ **Examen échographique abdominal sans anomalie décelable ce jour.**

Prise en charge conseillée :

Cytoponction du nodule sous axillaire droite pour analyse (recherche de mastocytome).
Radiographies thoraciques pour exploration de l'œsophage avec repas baryté si possible.
Régime d'éviction 1-2 mois : aliment hypoallergénique stricte, ou anallergique STRICT.
Endoscopie voie haute si les symptômes persistent.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

