



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'École d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 01/12/21
Dr.Vétérinaire : LEFEVRE

Propriétaire : PAW
Animal : "FAWKES", Abyssin 12A MC

ANAMNESE

- Dysorexie**
- Amaigrissement**

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Présence de quelques particules échogènes en suspension.
Contenu anéchogène. Absence de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille légèrement diminuée. A gauche. Contours bosselés avec rétraction corticale hyperéchogène au pôle caudal.
Les deux reins sont hyperéchogènes avec atténuation de la différenciation cortico-médullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique à droite. Pyélectasie discrète à gauche 1,9 mm.
RG 3,29 cm, RD 4,02 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales.
SG : 5,1, SD : 3,6 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille augmentée. Echogénicité légèrement hétérogène et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme discrètement hétérogène, de taille augmentée. Contours légèrement bosselés. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Modérément distendu. Paroi normale 2,2 mm avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie. Canal pancréatique dilaté modérément au sein du lobe gauche 3,8 mm.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale à légèrement augmentée.
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Splénique hypertrophié 4,1 mm.
Mésentériques hypertrophiés 6 mm.

- **Mésentère/ Cavité abdominale :** Hyperéchogénicité diffuse et épanchement abdominal en faible quantité.
- **Appareil reproducteur :** Castré
- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Réalisées : foie et rate.

CONCLUSION

- ❖ **Péritonite abdominale diffuse associée à une splénomégalie et hépatomégalie marquée. Anomalies sévères.**

Un lymphome, une hémopathie maligne sont possibles avec cet aspect.
Un coronavirus de la PIF est également à suspecter.

Des ponctions foie/rate sont réalisées ce jour pour recherche de cellules tumorales.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON

