



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 10/01/22
Dr.Vétérinaire : BUNEL

Propriétaire : DREUX
Animal : "OSLO", européen MC né le
31/03/2018. 6,7 Kgs

ANAMNESE

- Vomissements épisodiques**
- Surpoids.**

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène avec particules échogènes en suspension en faible quantité. Absence de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 4,69 cm, RD 4,67 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 4,7, SD : 4,1 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments, présence d'un peu de liquide dans l'ampoule pylorique. Paroi normale 1,8 mm avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille et échogénicité normale à gauche. Au niveau du corps et du lobe droit : taille normale, avec présence d'une discrète hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale. Aspect festonné.
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Ratio des couches modifié avec une musculature légèrement plus épaisse que la normale. Présence d'une fine ligne échogène en profondeur de la muqueuse. Trajet rectiligne sur plusieurs portions. Epaisseur normale 2 mm.
- **Colon :** Paroi fine 0,84 mm d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux. JJ 4,3 mm d'épaisseur.

- **Mésentère/ Cavit  abdominale :** Discr te hyper chog nicit  graisseuse en p riph rie du lobe droit et du corps du pancr as. Epanchement abdominal tr s discret non ponctionnable.
- **Appareil reproducteur :** Castr .
- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non r alis es.

CONCLUSION

- ❖ **Pancr atite aigu  d'intensit  mod r e au niveau du corps et du lobe droit du pancr as.**
- ❖ **Duod nite associ e, d'intensit  mod r e.**
- ❖ **Ent rite chronique non sp cifique d'intensit  mod r e.**

Prise en charge conseill e :

Perfusion de r hydratation IV, antalgiques, gastroprotecteurs (Ulcar Nd par exemple, phsophaluvet ND), aliment hyperdigestible   vie, limiter le surpoids, anti m tiques.

Confraternellement,

Dr Marie-H l ne LASSERON

