



mhlasseron@yahoo.fr

Tel. 06 16 66 66 54

www.veterinaires-consultants.fr

ECHOGRAPHIE ABDOMEN

Consultation de médecine interne

Dr Marie-Hélène LASSERON

Vétérinaire Consultante

Échographie - Cardiologie - Médecine Interne

Ancienne attachée de consultation d'imagerie de l'Ecole d'ALFORT

Diplômée du CEAV de Médecine Interne

Diplôme InterUniversitaire d'Imagerie Vasculaire Non Invasive.

N°Ordinal: 18551

Date : 05/01/21
Dr.Vétérinaire : RAUX

Propriétaire : MARCHAND
Animal : "JOUPLY", caniche M 7A castré

ANAMNESE

- Augmentation progressive des ALT (178-256-320 UI/L depuis Aout 2021)**
-

EXAMEN

- **Vessie :** En réplétion. Paroi fine <1 mm et régulière. Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale.
- **Reins :** Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. RG 3,86 cm, RD 4,14 cm.
- **Uretères :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Urètre :** Absence d'anomalie échographiquement visible.
- **Surrénales :** Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. SG : 4,8, SD : 4,2 mm d'épaisseur maximale.
- **Rate :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation.
- **Foie :** Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité augmentée de façon diffuse, et contours normaux. Absence d'anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires.
- **Vésicule biliaire :** Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène.
- **Estomac :** Absence d'aliments. Présence de gaz. Paroi normale 1,7 avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale.
- **Pancréas :** Taille normale échogénicité augmentée de façon diffuse, de façon plus marquée sur le lobe gauche et le corps. Absence d'hyperéchogénicité de la graisse abdominale en périphérie.
- **Duodénum :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 5 mm
- **Jéjunum/iléon :** Paroi régulière avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 3,4 mm jj et iléon 2,9 mm
- **Colon :** Paroi fine d'aspect normal. Présence d'air et de selles normales.
- **Nœuds lymphatiques :** Normaux.
- **Mésentère/** RAS
- **Cavité abdominale :**
- **Appareil reproducteur :** Castré prostate involuée

- **Autre**
- **Cytoponctions/ biopsies :** Non réalisées.

CONCLUSION

- ❖ **Hyperéchogénéicité diffuse hépatique non spécifique.**
- ❖ **Surcharge graisseuse pancréatique bénigne.**

Envisager une hépatite infectieuse ou chronique (surcharge en cuivre, dysimmunitaire...).


Prise en charge conseillée :

Amoxicilline acide clavulanique + metronidazole 15 mg/kg M et S pendant 3 semaines + Delursan ND en pharmacie 15 mg/kg/j en 1 pq 3 semaines.

Nouveau contrôle des ALT dans 3 semaines. S'ils restent augmentés, des biopsies hépatiques après évaluation de temps de coagulation sont très fortement conseillée, une hépatite chronique pouvant évoluer à bas bruit vers une cirrhose hépatique définitive.

Confraternellement,

Dr Marie-Hélène LASSERON



Marie-Hélène LASSERON
11 rue de Verdun
14780 LION-SUR-MER
N°18551